

TRIAJE NEONATAL
del Protocolo de Evaluación del Frenillo de la Lengua de Bebés
 Martinelli, 2015

Nombre y apellidos: _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / _____ Fecha do Examen: ____ / ____ / _____

1. Postura habitual de los labios



() Labios cerrados (0)



() Labios entreabiertos (1)



() Labios abiertos (1)

2. Tendencia de la posición de la lengua durante el llanto



() Lengua en la línea media (0)



() Lengua elevada (0)



() Lengua en la línea media con elevación de los laterales (2)



() Punta de la lengua baja con elevación de los laterales (2)

3. Forma de la punta de la lengua cuando se eleva durante el llanto o maniobra de elevación



() Redondeada (0)



() Ligera fisura en ápice (2)



() Forma de corazón (3)

4. Frenillo lingual



() Se puede visualizar



() No se puede visualizar



() Visualizado con maniobra*

*Maniobra de elevación y posteriorización de la lengua.

Si no se observa, realizar nuevamente el test en 30 días, utilizando el protocolo completo

4.1. Espesor del frenillo



() delgado (0)



() Grueso (2)

4.2. Fijación del frenillo en la cara sublingual (ventral) de la lengua



() En el tercio medio (0)



() Entre el tercio medio y el ápice (2)



() En el ápice (3)

4.3. Fijación del frenillo en el piso de la boca



() Visible a partir de las carúnculas sublinguales (0)



() Visible a partir de la cresta alveolar inferior (1)

Puntuación 0 a 4: normal ()

Puntuación 5 y 6: dudoso () Evaluar nuevamente en 30 días

Puntuación 7 o más: Alterado () Es necesaria la cirugía del frenillo lingual .