

SCREENING NEONATALE

del protocollo di valutazione del frenulo linguale nei neonati

Martinielli 2015

Traduzione a cura di Beghetto Anna

Nome: _____

Data dell'esame: ___/___/___

Data di nascita: ___/___/___

1. Postura delle labbra a riposo



(0) labbra chiuse



(1) labbra semiaperte



(1) labbra aperte

2. Posizionamento della lingua durante il pianto



(0) sulla linea mediana



(0) sollevata



(1) sulla linea mediana
con i lati sollevati



(2) bassa

3. Forma della punta della lingua durante il pianto



(0) arrotondata



(2) leggera fessura sull'apice



(3) a "forma di cuore"

4. Frenulo linguale



() possibile visualizzarlo



() non è possibile visualizzarlo



() visualizzato con manovra*

*Manovra di elevazione e posteriorizzazione della lingua. Se non è osservabile, eseguire il retest dopo 30 giorni

4.1. Spessore del frenulo



(0) sottile



(2) spesso

4.2. Attaccatura del frenulo sulla faccia ventrale della lingua



(0) nel terzo medio



(2) tra il terzo medio e l'apice



(3) sull'apice

4.3. Attaccatura del frenulo sul pavimento della bocca



(0) visibile a partire dalle
caruncule sublinguali



(1) visibile a partire dalle
creste alveolari inferiori

Punteggio da 0 a 4: normale ()

Punteggio da 5 a 6: dubbio () retest in data ___/___/___

Punteggio maggiore o uguale a 7: alterato () è necessario l'intervento